


# **INFORMACJA DLA HODOWCÓW** **DROBIU**

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu  
wysokiej zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8  
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania,  
Holandia),  
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).



**Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni  
zachowywać szczególną ostrożność i stosować  
odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące  
ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do  
gospodarstwa,  
w szczególności:**

- **zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;**
- **nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których  
drób jest utrzymywany;**
- **stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne  
oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi**

ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

## **Hodowco !!!**

**Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)**

### **Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu**

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonek, silne łzawienie, obrzęk zatok podczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.