

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

O SPOSOBIE ODKAŻANIA OBORNIKA, ŚCIOŁKI I GNOJOWICY.

1. W przypadku obornika i ściółki możliwe odkażanie prowadzi się na terenie gospodarstwa zakażonego w pobliżu pomieszczeń inwentarskich, na glebie ściślej i nieprzepuszczalnej w następujący sposób:

- wyznacza się miejsce na kopiec z obornikiem i ściółką o wymiarach 2 m szerokości i nieograniczonej długości,
- dno kopca, po wyrównaniu, wykłada się folią,
- na folię nakłada się warstwę obornika niezakażonego (np. pochodzącego od koniowatych lub bydła) lub w przypadku jego braku w gospodarstwie warstwę słomy,
- zakażony obornik układa się w kształt stożka na wysokość nieprzekraczającą 1,5 m od powierzchni gruntu,
- przykrywa się ściółką i warstwą ziemi o grubości co najmniej 20 cm i polewa się produktem biobójczym a następnie pozostawia się na okres co najmniej 42 dni lub poprzez:
 - spalenie albo użycie pary wodnej o temperaturze nie mniejszej niż 70 °C;
 - zakopanie na głębokość uniemożliwiająca dostęp do nich zwierząt.

2. W przypadku obecności gnojowicy i gnojówki w zakażonym gospodarstwie istnieje możliwość ich odkażenia poprzez:

- dodanie do zbiornika z gnojówką lub gnojowicą produktu biobójczego,
- wymieszanie produktu biobójczego z gnojówką lub gnojowicą,
- pozostawienie zawartości tego zbiornika - po uprzednim jego zabezpieczeniu przed dostępem zwierząt, w szczególności owadów i dzikich ptaków - na okres co najmniej 45 dni.